

## TECHNIQUES DE SEMIS

Familles	Légumes	Distance interligne	Distance intraligne	Date semis (S= serre)	Besoin MO	T°C Germ.	Technique semis
Racine	Carotte	30	2	mars-juillet	Moyen	10	
	Betterave	30	15	mars-juillet	Moyen	8	
	Navet	30	5-10	fevrier-octobre (S)	Faible	8	
	Radis	20	2	fevrier-octobre (S)	Faible	8	
	Céleri-rave	40	40	fevrier (S)	Fort	18	
	Panais	40	30	mars-juin	Moyen	21	
	Pomme de terre	70	40	mars (S)-juin	Fort	15-26	
	Radis noir	30	15	juillet-aout	Faible	15	
Feuille	Poireau	30	10	fevrier (S)-mars	Fort	10	
	Epinard	30	20	mars et août	Fort	8	
	Echalote	20	15	mars	Faible	8	
	Oignon	20	10	mars-avril	Faible	8	
	Blette	40	30	mars-juillet	Moyen	8	
	Salade	30	30	mars-juillet	Moyen	10-12	
	Scarole	40	40	juillet-aout	Moyen	10-12	
	Mâche	20	5	août-septembre	Faible	9	
	Celeri-branche	50	30	Mars -Avril (intérieur)	Fort	18	
	Chou-fleur	50	50	fev (S) et/ou mai-juin	Fort	10-12	
	Chou d'été	50	50	fev (S)-avril (S)	Fort	10-12	
	Chou d'hiver	50	50	mai-juin	Fort	10-12	
	Chou de Bruxelles	50	50	mai-juin	Faible	10-12	
Fruit	Courgette	100	80	avril (S)-juin	Fort	15	
	Concombre	100	80	avril (S)-juin	Fort	15	
	Melon-pastèque	100	100	avril (S)-juin	Fort	20	
	haricot	40	30	mai-juillet	Faible	15	
	feve	40	25	fev-avril	Faible	10-12	
	Pois	40	5 ou 30	fev-avril	Faible	10-12	
	Courges	100	100	mai	Fort	20	
	Maïs	30	15	Avril-mai	Fort	15	
	Tomate	70	40	mars-avril (intérieur)	Fort	18	
	Aubergine	50	50	mars-avril (intérieur)	Fort	20	
	Poivron	50	40	mars-avril (intérieur)	Fort	20	